

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Januar 2004 (15.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/004743 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: A61K 31/7115,
31/7125, 39/00, 35/66, A61P 37/04

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007175

(22) Internationales Anmeldedatum:
3. Juli 2003 (03.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 29 872.6 3. Juli 2002 (03.07.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): CUREVAC GMBH [DE/DE]; Auf der Morgenstelle
18, 72076 Tübingen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HOERR, Ingmar
[DE/DE]; Hagellocherweg 40, 72070 Tübingen (DE).
VON DER MÜLBE, Florian [DE/DE]; Wannweilerstr.
31/2, 72138 Kirchentellinsfurt (DE). PASCOLO, Steve
[DE/DE]; Bursagasse 12, 72072 Tübingen (DE).

(74) Anwälte: GRAF VON STOSCH, Andreas usw.;
Flüggenstr. 13, 80639 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,
RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

WO 2004/004743 A1

(54) Title: IMMUNOSTIMULATION BY CHEMICALLY MODIFIED RNA

(54) Bezeichnung: IMMUNOSTIMULATION DURCH CHEMISCH MODIFIZIERTE RNA

(57) Abstract: The invention relates to an immunostimulating agent containing at least one chemically modified RNA. The invention also relates to a vaccine that contains at least one antigen in conjunction with the immunostimulating agent. The inventive immunostimulating agent and the inventive vaccine are used, in particular, against infectious diseases or cancers.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein immunstimulierendes Mittel, enthaltend mindestens eine chemisch modifizierte RNA. Des weiteren betrifft die Erfindung eine Vakzine, die mindestens ein Antigen in Verbindung mit dem immunstimulierenden Mittel enthält. Das erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel und die erfindungsgemäße Vakzine werden insbesondere gegen Infektionserkrankungen oder Krebserkrankungen eingesetzt.

5

10

Immunstimulation durch chemisch modifizierte RNA

Die vorliegende Erfindung betrifft ein immunstimulierendes Mittel, enthaltend mindestens
15 eine chemisch modifizierte RNA. Des weiteren betrifft die Erfindung eine Vakzine, die
mindestens ein Antigen in Verbindung mit dem immunstimulierenden Mittel enthält. Das
erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel und die erfindungsgemäße Vakzine werden
insbesondere gegen Infektionserkrankungen oder Krebserkrankungen eingesetzt.

20 RNA spielt in Form von mRNA, tRNA und rRNA bei der Expression der genetischen
Information in der Zelle eine zentrale Rolle. Darüber hinaus wurde jedoch in einigen Un-
tersuchungen gezeigt, dass RNA auch als solche an der Regulation von etlichen Prozessen,
insbesondere im Organismus von Säugetieren, beteiligt ist. Dabei kann RNA die Rolle als
Kommunikationsbotenstoff einnehmen (Benner, FEBS Lett. 1988, 232: 225-228). Des
25 weiteren wurde eine RNA mit großer Homologie zu einer gewöhnlichen mRNA entdeckt,
die aber nicht translatiert wird, sondern eine Funktion in der intrazellulären Regulation
ausübt (Brown et al., Cell 1992, 71: 527-542). Derartige regulatorisch wirksame RNA ist
durch eine unvollständige Sequenz der Ribosomen-Bindungsstelle (Kozak-Sequenz:
GCCGCCACCAUGG, wobei das AUG das Startcodon bildet (vgl. Kozak, Gene Expr.
30 1991, 1(2): 117-125) gekennzeichnet, in der sie sich von (normaler) mRNA unterscheidet.
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass diese Klasse der regulatorischen RNA auch in
aktivierten Zellen des Immunsystems, bspw. CD4⁺-T-Zellen vorkommt (Liu et al., Geno-
mics 1997, 39: 171-184).

Sowohl bei der klassischen als auch bei der genetischen Vakzinierung tritt häufig das Problem auf, dass nur eine geringe und damit häufig unzureichende Immunantwort im zu therapierenden bzw. zu impfenden Organismus hervorgerufen wird. Daher werden Vakzinen häufig sog. Adjuvanzen, d.h. Substanzen beigefügt, die eine Immunantwort gegen ein
5 Antigen erhöhen und/oder gerichtet beeinflussen können. Im Stand der Technik lange bekannte Adjuvanzen sind z.B. Aluminiumhydroxid, das Freud'sche Adjuvans u.ä. Derartige Adjuvanzen erzeugen jedoch unerwünschte Nebenwirkungen, bspw. sehr schmerzhafte Reizungen und Entzündungen am Ort der Applikation. Des weiteren werden auch toxische Nebenwirkungen, insbesondere Gewebse Nekrosen beobachtet. Schließlich bewir-
10 ken diese bekannten Adjuvanzen nur eine unzureichende Stimulation der zellulären Immunantwort, da lediglich B-Zellen aktiviert werden.

Des weiteren ist von bakterieller DNA bekannt, dass sie aufgrund des Vorhandenseins von nicht-methylierten CG-Motiven immunstimulierend wirkt, weshalb derartige CpG-
15 DNA als immunstimulierendes Mittel allein und als Adjuvans für Vakzine vorgeschlagen wurde; vgl. US-Patent 5,663,153. Diese immunstimulierende Eigenschaft von DNA kann auch durch DNA-Oligonucleotide erreicht werden, die durch Phosphorthioat-Modifikation stabilisiert sind (US-Patent 6,239,116). Das US-Patent 6,406,705 offenbart schließlich Adjuvans-Zusammensetzungen, welche eine synergistische Kombination aus
20 einem CpG-Oligodesoxyribonucleotid und einem Nicht-Nucleinsäure-Adjuvans enthalten.

Die Verwendung von DNA als immunstimulierendes Mittel oder als Adjuvans in Vakzinen ist jedoch unter mehreren Gesichtspunkten nachteilig. DNA wird in der Blutbahn nur relativ langsam abgebaut, so dass es bei der Verwendung von immunstimulierender DNA
25 zu einer Bildung von Anti-DNA-Antikörpern kommen kann, was im Tiermodell bei der Maus bestätigt wurde (Gilkeson et al., J. Clin. Invest. 1995, 95: 1398-1402). Die mögliche Persistenz der DNA im Organismus kann so zu einer Überaktivierung des Immunsystems führen, welche bekanntermaßen bei Mäusen in einer Splenomegalie resultiert (Montheith et al., Anticancer Drug Res. 1997, 12(5): 421-432). Des weiteren kann DNA mit dem
30 Wirtsgenom wechselwirken, insbesondere durch Integration in das Wirtsgenom Mutationen hervorrufen. So kann es bspw. zu einer Insertion der eingebrachten DNA in ein intaktes Gen kommen, was eine Mutation darstellt, welche die Funktion des endogenen Gens

behindert oder gar vollkommen ausschaltet. Durch solche Integrationsereignisse können einerseits für die Zelle lebenswichtige Enzymsysteme ausgeschaltet werden, andererseits besteht auch die Gefahr einer Transformation der so veränderten Zelle in einen entarteten Zustand, falls durch die Integration der Fremd-DNA ein für die Regulation des Zellwachstums entscheidendes Gen verändert wird. Daher kann bei der Verwendung von DNA als
5 immunstimulierendem Mittel ein Risiko der Krebsbildung nicht ausgeschlossen werden.

Riedl et al. (J. Immunol. 2002, 168(10): 4951-4959) offenbaren, dass an eine Arg-reiche Domäne des HBcAg-Nucleocapsids gebundene RNA eine Th1-vermittelte Immunantwort
10 gegen HbcAg hervorruft. Die Arg-reiche Domäne des Nucleocapsids weist Ähnlichkeit zu Protaminen auf und bindet unspezifisch Nucleinsäuren.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein neues System zur Verbesserung der Immunstimulation allgemein und der Vakzinierung im Besonderen bereitzustellen, das eine besonders effiziente Immunantwort im zu therapierenden bzw. zu impfenden Patienten hervorruft, die Nachteile bekannter Immunstimulanzien jedoch vermeidet.
15

Diese Aufgabe wird durch die in den Ansprüchen gekennzeichneten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung gelöst.
20

Insbesondere wird erfindungsgemäß ein immunstimulierendes Mittel bereitgestellt, enthaltend mindestens eine RNA, die mindestens eine chemische Modifikation aufweist. Somit wird gemäß der vorliegenden Erfindung auch die Verwendung der chemisch modifizierten
25 RNA zur Herstellung eines immunstimulierenden Mittels offenbart.

Die vorliegende Erfindung beruht auf der überraschenden Feststellung, dass chemisch modifizierte RNA Zellen des Immunsystems (vornehmlich Antigen-präsentierende Zellen, insbesondere dendritische Zellen (DC), sowie die Abwehrzellen, bspw. in Form von T-Zellen), besonders stark aktiviert und so das Immunsystem eines Organismus zu stimuliert. Insbesondere führt das erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel, enthaltend die chemisch modifizierte RNA, zu einer vermehrten Freisetzung von immunsteuernden
30

Cytokinen, bspw. Interleukinen, wie IL-6, IL-12 usw. Daher ist es bspw. möglich, das immunstimulierende Mittel der vorliegenden Erfindung gegen Infektionen oder Krebserkrankungen einzusetzen, indem es z.B. in den infizierten Organismus oder den Tumor selbst injiziert wird. Als Beispiele für mit dem erfindungsgemäßen immunstimulierenden Mittel behandelbare Krebserkrankungen können malignes Melanom, Kolon-Karzinom, Lymphome, Sarkome, kleinzelliges Lungenkarzinom, Blastome usw., genannt werden. Des weiteren wird das immunstimulierende Mittel vorteilhaft gegen Infektionserkrankungen (z.B. virale Infektionskrankheiten, wie AIDS (HIV), Hepatitis A, B oder C, Herpes, Herpes Zoster (Varizellen), Röteln (Rubeola-Virus), Gelbfieber, Dengue usw. (Flavi-Viren), Grippe (Influenza-Viren), hämorrhagische Infektionskrankheiten (Marburg- oder Ebola-Viren), bakterielle Infektionserkrankungen, wie Legionärskrankheit (*Legionella*), Magengeschwür (*Helicobacter*), Cholera (*Vibrio*), *E.coli*-Infektionen, Staphylokokken-Infektionen, Salmonellen-Infektionen oder Streptokokken-Infektionen (Tetanus), protozoologische Infektionserkrankungen (Malaria, Schlafkrankheit, Leishmaniose, Toxoplasmose, d.h. Infektionen durch Plasmodium, Trypanosomen, Leishmania und Toxoplasmen, oder Pilzinfektionen, die bspw. durch *Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Blastomyces dermatitidis* oder *Candida albicans* hervorgerufen werden) eingesetzt.

Der Begriff "chemische Modifikation" bedeutet, dass die im erfindungsgemäßen Immunstimulans enthaltene RNA durch Ersetzen, Anfügen oder Entfernen einzelner oder mehrerer Atome oder Atomgruppen im Vergleich zu natürlich vorkommenden RNA-Spezies verändert ist.

Vorzugsweise ist die chemische Modifikation derart ausgestaltet, dass die RNA mindestens ein Analoges natürlich vorkommender Nucleotide enthält.

In einer keineswegs abschließenden Aufzählung können als Beispiele erfindungsgemäß verwendbarer Nucleotidanaloga Phosphoramidate, Phosphorthioate, Peptidnucleotide, Methylphosphonate, 7-Deazaguanosin, 5-Methylcytosin und Inosin genannt werden. Die Herstellung derartiger Analoga sind einem Fachmann bspw. aus den US-Patenten 4,373,071, US 4,401,796, US 4,415,732, US 4,458,066, US 4,500,707, US 4,668,777, US 4,973,679, US 5,047,524, US 5,132,418, US 5,153,319, US 5,262,530 und 5,700,642 be-

kannt. Besonders bevorzugt ist es, wenn die RNA aus Nucleotidanaloga, bspw. den vorgenannten Analoga, besteht.

Als weitere chemische Modifikationen ist beispielsweise die Anfügung einer sog. "5'-Cap"-
5 Struktur, d.h. ein modifiziertes Guanosin-Nucleotid, zu nennen, insbesondere m⁷G(5')ppp
(5'(A,G(5')ppp(5')A und G(5')ppp(5')G.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung handelt
es sich bei der chemisch modifizierten RNA um relativ kurze RNA-Moleküle, die bspw.
10 aus etwa 2 bis etwa 1000 Nucleotiden, vorzugsweise aus etwa 8 bis etwa 200 Nucleotiden,
besonders bevorzugt aus 15 bis etwa 31 Nucleotiden, besteht.

Erfindungsgemäß kann die im immunstimulierenden Mittel enthaltene RNA einzel- oder
doppelsträngig sein. Dabei kann insbesondere doppelsträngige RNA mit einer Länge von
15 21 Nucleotiden auch als Interferenz-RNA eingesetzt werden, um spezifisch Gene, z.B.
von Tumorzellen, auszuschalten, und so diese Zellen gezielt abzutöten oder um darin aktive,
für eine maligne Entartung verantwortlich zu machende Gene zu inaktivieren (Elbashir
et al., Nature 2001, 411, 494-498).

20 Spezifische Beispiele erfindungsgemäß einsetzbarer RNA-Spezies ergeben sich, wenn die
RNA eine der folgenden Sequenzen aufweist: 5'-UCCAUGACGUUCCUGAUGCU-3', 5'-
UCCAUGACGUUCCUGACGUU-3' oder 5'-UCCAGGACUUCUCUCAGGUU-3'.
Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn die RNA-Spezies Phosphorthioat-modifiziert sind.

25 Gegebenenfalls kann das erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel die chemisch modifizierte
RNA in Verbindung mit einem pharmazeutisch verträglichen Träger und/oder
Vehikel enthalten.

Zur weiteren Erhöhung der Immunogenizität kann das erfindungsgemäße immunstimulierende
30 Mittel ein oder mehrere Adjuvanzen enthalten. Hierbei wird in Bezug auf die Immunstimulation
vorzugsweise eine synergistische Wirkung von erfindungsgemäßer chemisch modifizierter RNA
und dem Adjuvans erzielt. Unter "Adjuvans" ist dabei jede Ver-

- bindung zu verstehen, die eine Immunantwort begünstigt. In Abhängigkeit der verschiedenen Arten von Adjuvantien können diesbezüglich verschiedene Mechanismen in Betracht kommen. Bspw. bilden Verbindungen, welche die Reifung der DC erlauben, bspw. Lipopolysaccharide, TNF- α oder CD40-Ligand, eine erste Klasse geeigneter Adjuvantien.
- 5 Allgemein kann jedes das Immunsystem beeinflussende Agens von der Art eines "Gefahrsignals" (LPS, GP96 usw.) oder Cytokine, wie GM-CSF, als Adjuvans verwendet werden, welche es erlauben, eine Immunantwort zu verstärken und/oder gerichtet zu beeinflussen. Gegebenenfalls können hierbei auch CpG-Oligonucleotide verwendet werden, wobei allerdings deren unter Umständen auftretenden Nebenwirkungen, wie vorstehend dargelegt,
- 10 abzuwägen sind. Aufgrund des Vorhandenseins des erfindungsgemäßen immunstimulierenden Mittels, enthaltend die chemisch modifizierte RNA, als primärem Immunstimulans ist jedoch nur eine verhältnismäßig geringe Menge an CpG-DNA erforderlich (im Vergleich zu einer Immunstimulation nur mit CpG-DNA), weshalb eine synergistische Wirkung von erfindungsgemäßem immunstimulierendem Mittel und CpG-DNA im allgemeinen
- 15 zu einer positiven Bewertung dieser Kombination führt. Besonders bevorzugte Adjuvantien sind Cytokine, wie Monokine, Lymphokine, Interleukine oder Chemokine, z.B. IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12, INF- α , INF- γ , GM-CSF, LT- α oder Wachstumsfaktoren, bspw. hGH, bevorzugt. Weitere bekannte Adjuvantien sind Aluminiumhydroxid, das Freud'sche Adjuvans sowie die weiter unten genannten stabilisierenden kationischen Peptide bzw. Polypeptide, wie Protamin, sowie kationische Polysaccharide, insbesondere Chitosan. Des weiteren sind Lipopeptide, wie Pam3Cys, ebenfalls besonders geeignet, um als Adjuvantien im immunstimulierenden Mittel der vorliegenden Erfindung eingesetzt zu werden; vgl. Deres et al, Nature 1989, 342: 561-564.
- 25 Neben dem direkten Einsatz zum Starten einer Immunreaktion, bspw. gegen einen pathogenen Keim oder gegen einen Tumor, kann das immunstimulierende Mittel auch vorteilhaft zur Verstärkung der Immunantwort gegen ein Antigen eingesetzt werden. Daher kann die chemisch modifizierte RNA zur Herstellung einer Vakzine verwendet werden, in der sie als Adjuvans wirkt, das die spezifische Immunantwort gegen das jeweilige Antigen bzw.
- 30 die jeweiligen Antigene begünstigt.

Somit betrifft ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung eine Vakzine, enthaltend das vorstehend definierte immunstimulierende Mittel und mindestens ein Antigen.

Bei der "klassischen" Vakzinierung enthält die erfindungsgemäße Vakzine bzw. die unter Verwendung der chemisch modifizierten RNA herzustellende Vakzine das mindestens eine Antigen selbst. Unter einem "Antigen" ist jede Struktur zu verstehen, welche die Bildung von Antikörpern und/oder die Aktivierung einer zellulären Immunantwort hervorrufen kann. Erfindungsgemäß werden daher die Begriffe "Antigen" und "Immunogen" synonym verwendet. Beispiele von Antigenen sind Peptide, Polypeptide, also auch Proteine, Zellen, Zellextrakte, Polysaccharide, Polysaccharidkonjugate, Lipide, Polykolipide und Kohlenhydrate. Als Antigene kommen bspw. Tumorantigene, virale, bakterielle, Pilz- und protozoologische Antigene in Betracht. Bevorzugt sind dabei Oberflächenantigene von Tumorzellen und Oberflächenantigene, insbesondere sekretierte Formen, viraler, bakterieller, Pilz- oder protozoologischer Pathogene. Selbstverständlich kann das Antigen in der erfindungsgemäßen Vakzine auch in Form eines an einen geeigneten Träger gekoppelten Haptens vorliegen. Geeignete Träger sind einem Fachmann bekannt und schließen bspw. humanes Serumalbumin (HSA), Polyethylenglykole (PEG) u.ä. ein. Die Kopplung des Haptens an den Träger erfolgt gemäß im Stand der Technik bekannter Verfahren, bspw. im Fall eines Polypeptidträgers über eine Amidbindung an einen Lys-Rest.

20

Bei der genetischen Vakzinierung mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vakzine bzw. der unter Verwendung der chemisch modifizierten RNA herzustellenden genetischen Vakzine erfolgt die Stimulierung einer Immunantwort durch die Einbringung der genetischen Information für das mindestens eine Antigen (in diesem Fall also ein Peptid- oder Polypeptid-Antigen) in Form einer für dieses Antigen codierenden Nucleinsäure, insbesondere einer DNA oder einer RNA (vorzugsweise einer mRNA), in den Organismus bzw. in die Zelle. Die in der Vakzine enthaltene Nucleinsäure wird in das Antigen translatiert, d.h. das von der Nucleinsäure codierte Polypeptid bzw. ein antigenes Peptid wird exprimiert, wodurch eine gegen dieses Antigen gerichtete Immunantwort stimuliert wird. Bei der Vakzinierung gegen einen pathologischen Keim, d.h. ein Virus, ein Bakterium oder ein protozoologischer Keim, wird daher bevorzugt ein Oberflächenantigen eines derartigen Keims zur Vakzinierung mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vakzine, enthaltend eine für das Ober-

30

flächenantigen codierende Nucleinsäure, verwendet. Im Fall der Verwendung als genetische Vakzine zur Behandlung von Krebs wird die Immunantwort durch Einbringung der genetischen Information für Tumorantigene, insbesondere Proteine, die ausschließlich auf Krebszellen exprimiert werden, erreicht, indem eine erfindungsgemäße Vakzine verabreicht wird, die für ein derartiges Krebsantigen codierende Nucleinsäure enthält. Dadurch wird das bzw. werden die Krebsantigen(e) im Organismus exprimiert, wodurch eine Immunantwort hervorgerufen wird, die wirksam gegen die Krebszellen gerichtet ist.

Die erfindungsgemäße Vakzine kommt insbesondere zur Behandlung von Krebserkrankungen in Betracht. Dabei wird vorzugsweise ein tumorspezifisches Oberflächenantigen (TSSA) oder aber eine Nucleinsäure, die für eine derartiges Antigen codiert, verwendet. So kann die erfindungsgemäße Vakzine zur Behandlung der vorstehend in Bezug auf das erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel genannten Krebserkrankungen eingesetzt werden. Spezifische Beispiele von erfindungsgemäß in der Vakzine verwendbaren Tumorantigenen sind u.a. 707-AP, AFP, ART-4, BAGE, β -Catenin/m, Bcr-abl, CAMEL, CAP-1, CASP-8, CDC27/m, CDK4/m, CEA, CT, Cyp-B, DAM, ELF2M, ETV6-AML1, G250, GAGE, GnT-V, Gp100, HAGE, HER-2/neu, HLA-A*0201-R170I, HPV-E7, HSP70-2M, HAST-2, hTERT (oder hTRT), iCE, KIAA0205, LAGE, LDLR/FUT, MAGE, MART-1/Melan-A, MC1R, Myosin/m, MUC1, MUM-1, -2, -3, NA88-A, NY-ESO-1, p190 minor bcr-abl, Pml/RAR α , PRAME, PSA, PSM, RAGE, RU1 oder RU2, SAGE, SART-1 oder SART-3, TEL/AML1, TPI/m, TRP-1, TRP-2, TRP-2/INT2 und WT1.

Des weiteren wird die erfindungsgemäße Vakzine gegen Infektionserkrankungen, insbesondere die vorstehend in Bezug auf das erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel genannten Infektionen, eingesetzt. Vorzugsweise werden auch im Falle von Infektionserkrankungen die entsprechenden Oberflächenantigene mit dem stärksten antigenen Potenzial bzw. eine dafür codierende Nucleinsäure in der Vakzine verwendet. Bei den genannten Antigenen pathogener Keime bzw. Organismen, insbesondere bei viralen Antigenen, ist dies typischerweise eine sekretierte Form eines Oberflächenantigens. Des weiteren werden erfindungsgemäß bevorzugt Polyepitope bzw. dafür codierende Nucleinsäuren, insbesondere mRNAs eingesetzt, wobei es sich bevorzugt um Polyepitope der vorstehend genann-

ten Antigene, insbesondere Oberflächenantigene von pathogenen Keimen bzw. Organismen oder Tumorzellen, vorzugsweise sekretierter Proteinformen, handelt.

Darüber hinaus kann eine für mindestens ein Antigen codierende Nucleinsäure, die in der
5 erfindungsgemäßen Vakzine enthalten sein kann, neben dem für eine antigenes Peptid bzw. Polypeptid codierenden Abschnitt auch mindestens einen weiteren funktionalen Abschnitt enthalten, der bspw. für ein die Immunantwort förderndes Cytokin, insbesondere die vorstehend unter dem Gesichtspunkt des "Adjuvans" genannten, codiert.

10 Wie bereits erwähnt, kann es sich bei der mindestens ein Antigen codierenden Nucleinsäure um DNA oder RNA handeln. Zur Einbringung der genetischen Information für ein Antigen in eine Zelle bzw. einen Organismus ist im Falle einer erfindungsgemäßen DNA-Vakzine im allgemeinen ein geeigneter Vektor, welcher einen das jeweilige Antigen codierenden Abschnitt enthält, erforderlich. Als spezifische Beispiele derartiger Vektoren können
15 die Vektoren der Serien pVITRO, pVIVO, pVAC, pBOOST usw. (InvivoGen, San Diego, CA, USA) genannt werden, die unter der URL <http://www.invivogen.com> beschrieben sind, deren diesbezüglicher Offenbarungsgehalt vollumfänglich in die vorliegende Erfindung aufgenommen ist.

20 Im Zusammenhang mit erfindungsgemäßen DNA-Vakzinen können verschiedene Verfahren zur Einbringung der DNA in Zellen, wie bspw. Calciumphosphat-Transfektion, Polyren-Transfektion, Protoblasten-Fusion, Elektroporation, Mikroinjektion und Lipofektion, genannt werden, wobei insbesondere die Lipofektion bevorzugt ist.

25 Bei einer DNA-Vakzine ist jedoch die Verwendung von DNA-Viren als DNA-Vehikel bevorzugt. Derartige Viren haben den Vorteil, dass aufgrund ihrer infektiösen Eigenschaften eine sehr hohe Transfektionsrate zu erzielen ist. Die verwendeten Viren werden genetisch verändert, so dass in der transfizierten Zelle keine funktionsfähigen infektiösen Partikel gebildet werden.

30

Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit ist der Einsatz von RNA als für mindestens ein Antigen codierende Nucleinsäure in der erfindungsgemäßen Vakzine bevorzugt. Insbe-

sondere bringt RNA nicht die Gefahr mit sich, stabil in das Genom der transfizierten Zelle integriert zu werden. Des weiteren sind keine viralen Sequenzen, wie Promotoren, zur wirksamen Transkription, erforderlich. Darüber hinaus wird RNA wesentlich einfacher *in vivo* abgebaut. Wohl aufgrund der gegenüber DNA relativ kurzen Halbwertszeit von RNA
5 im Blutkreislauf sind bisher keine anti-RNA-Antikörper nachgewiesen worden.

Daher ist es erfindungsgemäß bevorzugt, wenn die für mindestens ein Antigen codierende Nucleinsäure eine mRNA ist, welche einen für das mindestens ein Peptid- oder Polypeptid-Antigen codierenden Abschnitt enthält.

10

Im Vergleich zu DNA ist RNA in Lösung allerdings wesentlich instabiler. Für die Instabilität sind RNA-abbauende Enzyme, sog. RNAasen (Ribonucleasen), verantwortlich. Selbst kleinste Verunreinigungen von Ribonucleasen reichen aus, um RNA in Lösung vollständig abzubauen. Derartige RNase-Verunreinigungen können allgemein nur durch besondere
15 Behandlungen, insbesondere mit Diethylpyrocarbonat (DEPC), beseitigt werden. Der natürliche Abbau von mRNA im Cytoplasma von Zellen ist sehr fein reguliert. Diesbezüglich sind mehrere Mechanismen bekannt. So ist für eine funktionale mRNA die endständige Struktur von entscheidender Bedeutung. Am 5'-Ende befindet sich die sogenannte "Cap-Struktur" (ein modifiziertes Guanosin-Nucleotid) und am 3'-Ende eine Abfolge von bis zu
20 200 Adenosin-Nucleotiden (der sog. Poly-A-Schwanz). Über diese Strukturen wird die RNA als mRNA erkannt und der Abbau reguliert. Darüber hinaus gibt es weitere Prozesse, die RNA stabilisieren bzw. destabilisieren. Viele diese Prozesse sind noch unbekannt, oftmals scheint jedoch eine Wechselwirkung zwischen der RNA und Proteinen dafür maßgeblich zu sein. Bspw. wurde kürzlich ein "mRNA-Surveillance-System" beschrieben
25 (Hellerin und Parker, Ann. Rev. Genet. 1999, 33: 229 bis 260), bei dem durch bestimmte Feedback-Protein-Wechselwirkungen im Cytosol unvollständige oder Nonsense-mRNA erkannt und dem Abbau zugänglich gemacht wird, wobei ein Hauptteil dieser Prozesse durch Exonucleasen vollzogen wird.

30 Daher ist es bevorzugt, sowohl die erfindungsgemäße chemische modifizierte RNA als auch die gegebenenfalls in der Vakzine vorhandene, für ein Antigen codierende RNA, insbesondere eine mRNA, gegenüber dem Abbau durch RNasen zu stabilisieren.

Die Stabilisierung der chemisch modifizierten RNA und gegebenenfalls der für mindestens ein Antigen codierenden mRNA kann dadurch erfolgen, dass die chemisch modifizierte RNA bzw. die gegebenenfalls vorhandene, für das Antigen codierende mRNA mit einer

5 kationischen Verbindung, insbesondere einer polykationischen Verbindung, bspw. einem (poly)kationischen Peptid oder Protein, assoziiert bzw. komplexiert oder daran gebunden ist. Insbesondere ist dabei die Verwendung von Protamin als polykationischem, Nuclein-säure-bindenden Protein besonders wirksam. Des weiteren ist die Verwendung anderer kationischer Peptide oder Proteine, wie Poly-L-Lysin oder Histonen, ebenfalls möglich.

10 Diese Vorgehensweise zur Stabilisierung der modifizierten mRNA ist in EP-A-1083232 beschrieben, deren diesbezüglicher Offenbarungsgehalt in die vorliegende Erfindung vollumfänglich eingeschlossen ist. Weitere bevorzugte kationische Substanzen, die zur Stabilisierung der chemisch modifizierten RNA und/oder der gegebenenfalls in der erfindungsgemäßen Vakzine enthaltenen mRNA verwendet werden können, schließen kationische

15 Polysaccharide, bspw. Chitosan, ein. Die Assoziation oder Komplexierung mit kationischen Verbindungen verbessert auch den Transfer der RNA-Moleküle in die zu behandelnden Zellen bzw. den zu behandelnden Organismus.

In den Sequenzen eukaryotischer mRNAs gibt es destabilisierende Sequenzelemente

20 (DSE), an welche Signalproteine binden und den enzymatischen Abbau der mRNA *in vivo* regulieren. Daher werden zur weiteren Stabilisierung der in der erfindungsgemäßen Vakzine enthaltenen mRNA, insbesondere im für das mindestens eine Antigen codierenden Bereich, ein oder mehrere Veränderungen gegenüber dem entsprechenden Bereich der Wildtyp-mRNA vorgenommen, so dass keine destabilisierenden Sequenzelemente enthal-

25 ten sind. Selbstverständlich ist es erfindungsgemäß ebenfalls bevorzugt, gegebenenfalls in den nicht-translatierten Bereichen (3'- und/oder 5'-UTR) vorhandene DSE aus der mRNA zu eliminieren. Ebenfalls ist es hinsichtlich des erfindungsgemäßen immunstimulierenden Mittels bevorzugt, dass die Sequenz der darin enthaltenen chemisch modifizierten RNA keine derartigen destabilisierenden Sequenzen aufweist.

30

Beispiele der vorstehenden DSE sind AU-reiche Sequenzen ("AURES"), die in 3'-UTR-Abschnitten zahlreicher instabiler mRNA vorkommen (Caput et al., Proc. Natl. Acad. Sci.

USA 1986, 83: 1670 bis 1674). Die in der erfindungsgemäßen Vakzine enthaltenen RNA-Moleküle sind daher vorzugsweise derart gegenüber der Wildtyp-mRNA verändert, dass sie keine derartigen destabilisierenden Sequenzen aufweisen. Dies gilt auch für solche Sequenzmotive, die von möglichen Endonucleasen erkannt werden, bspw. die Sequenz GAACAAG, die im 3' UTR-Segment des für den Transferin-Rezeptor codierenden Gens
5 enthalten ist (Binder et al., EMBO J. 1994, 13: 1969 bis 1980). Vorzugsweise werden auch diese Sequenzmotive aus den chemisch modifizierten RNA-Molekülen des erfindungsgemäßen immunstimulierenden Mittels bzw. aus der gegebenenfalls in der erfindungsgemäßen Vakzine vorhandenen mRNA eliminiert.

10

Auch die mRNA-Moleküle, welche in der erfindungsgemäßen Vakzine enthalten sein können, weisen bevorzugt eine 5'-Cap-Struktur auf. Als Beispiele von Cap-Strukturen können wiederum m⁷G(5')ppp (5'(A,G(5')ppp(5')A und G(5')ppp(5')G genannt werden. Weiterhin kann auch die mRNA, wie oben hinsichtlich der chemisch modifizierten RNA erläutert,
15 Analoga natürlich vorkommender Nucleotide aufweisen.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung enthält die mRNA einen PolyA-Schwanz von mindestens 50 Nuclotiden, vorzugsweise mindestens 70 Nuclotiden, mehr bevorzugt mindestens 100 Nuclotiden, besonders bevorzugt
20 mindestens 200 Nuclotiden.

Für eine effiziente Translation der für mindestens ein Antigen codierenden mRNA ist weiterhin eine wirksame Bindung der Ribosomen an die Ribosomen-Bindungsstelle (Kozak-Sequenz: GCCGCCACCAUGG, das AUG bildet das Startcodon) erforderlich. Dies-
25 bezüglich ist festgestellt worden, dass ein erhöhter A/U-Gehalt um diese Stelle herum eine effizientere Ribosomen-Bindung an die mRNA ermöglicht.

Des weiteren ist es möglich, in die für mindestens ein Antigen codierenden mRNA eine oder mehrere sog. IRES (engl. "internal ribosomal entry side") einzufügen. Eine IRES
30 kann so als alleinige Ribosomen-Bindungsstelle fungieren, sie kann jedoch auch zur Bereitstellung einer mRNA dienen, die mehrere Peptide bzw. Polypeptide codiert, die unabhängig voneinander durch die Ribosomen translatiert werden sollen ("multicistronische

mRNA"). Beispiele erfindungsgemäß verwendbarer IRES-Sequenzen sind diejenigen aus Picomaviren (z.B. FMDV), Pestviren (CFFV), Polioviren (PV), Enzephalo-Myocarditis-Viren (ECMV), Maul-und-Klauenseuche-Viren (FMDV), Hepatitis-C-Viren (HCV), Klassisches-Schweinefieber-Viren (CSFV), Murines-Leukoma-Virus (MLV), Simean-
5 Immundefizienz-Viren (SIV) oder Cricket-Paralysis-Viren (CrPV).

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist die mRNA in den 5'- und/oder 3'-nicht translatierten Bereichen Stabilisierungssequenzen auf, die befähigt sind, die Halbwertszeit der mRNA im Cytosol zu erhöhen.

10

Diese Stabilisierungssequenzen können eine 100%ige Sequenzhomologie zu natürlich vorkommenden Sequenzen, die in Viren, Bakterien und Eukaryoten auftreten, aufweisen, können aber auch teilweise oder vollständig synthetischer Natur sein. Als Beispiel für stabilisierende Sequenzen, die in der vorliegenden Erfindung verwendbar sind, können die
15 nicht-translatierten Sequenzen (UTR) des β -Globingens, bspw. von *Homo sapiens* oder *Xenopus laevis*, genannt werden. Ein anderes Beispiel einer Stabilisierungssequenz weist die allgemeine Formel (C/U)CCAN_xCCC(U/A)Py_xUC(C/U)CC auf, die im 3'UTR der sehr stabilen mRNA enthalten ist, die für α -Globin, α -(I)-Collagen, 15-Lipoxygenase oder für Tyrosin-Hydroxylase codiert (vgl. Holcik et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1997, 94: 2410
20 bis 2414). Selbstverständlich können derartige Stabilisierungssequenzen einzeln oder in Kombination miteinander als auch in Kombination mit anderen, einem Fachmann bekannten Stabilisierungssequenzen verwendet werden.

Zur weiteren Erhöhung der Translationseffizienz der gegebenenfalls in der erfindungsgemäßen Vakzine enthaltenen mRNA kann der für das mindestens eine Antigen codierende Bereich (sowie jeder weitere gegebenenfalls enthaltene codierende Abschnitt) gegenüber einer entsprechenden Wildtyp-mRNA folgende Modifikationen aufweisen, die entweder alternativ oder in Kombination vorliegen können.

30 Zum einen kann der G/C-Gehalt des für das Peptid oder Polypeptid codierenden Bereichs der modifizierten mRNA größer sein als der G/C-Gehalt des codierenden Bereichs der für

das Peptid oder Polypeptid codierenden Wildtyp-mRNA, wobei die codierte Aminosäuresequenz gegenüber dem Wildtyp unverändert ist.

Diese Modifikation beruht auf der Tatsache, dass für eine effiziente Translation einer mRNA die Sequenzabfolge des zu translatierenden Bereichs der mRNA wesentlich ist. Dabei spielt die Zusammensetzung und die Abfolge der verschiedenen Nucleotide eine große Rolle. Insbesondere sind Sequenzen mit erhöhtem G(Guanosin)/C(Cytosin)-Gehalt stabiler als Sequenzen mit einem erhöhten A(Adenosin)/U(Uracil)-Gehalt. Daher werden erfindungsgemäß unter Beibehaltung der translatierten Aminosäureabfolge die Codons gegenüber der Wildtyp-mRNA derart variiert, dass sie vermehrt G/C-Nucleotide beinhalten. Da mehrere Codons für ein und dieselbe Aminosäure codieren (Degeneration des genetischen Codes), können die für die Stabilität günstigsten Codons ermittelt werden (alternative Codonverwendung, engl. "codon usage").

In Abhängigkeit von der durch die mRNA zu codierenden Aminosäure sind unterschiedliche Möglichkeiten zur Modifikation der mRNA-Sequenz gegenüber der Wildtyp-Sequenz möglich. Im Fall von Aminosäuren, die durch Codons codiert werden, die ausschließlich G- oder C- Nucleotide enthalten, ist keine Modifikation des Codons erforderlich. So erfordern die Codons für Pro (CCC oder CCG), Arg (CGC oder CGG), Ala (GCC oder GCG) und Gly (GGC oder GGG) keine Veränderung, da kein A oder U vorhanden ist.

In folgenden Fällen werden die Codons, welche A-und/oder U-Nucleotide enthalten durch Substituieren anderer Codons, welche die gleichen Aminosäuren codieren, jedoch kein A und/oder U enthalten, verändert. Beispiele sind:

Die Codons für Pro können von CCU oder CCA zu CCC oder CCG verändert werden;
die Codons für Arg können von CGU oder CGA oder AGA oder AGG zu CGC oder CGG verändert werden;
die Codons für Ala können von GCU oder GCA zu GCC oder GCG verändert werden;
die Codons für Gly können von GGU oder GGA zu GGC oder GGG verändert werden.

In anderen Fällen können A bzw. U-Nucleotide zwar nicht aus den Codons eliminiert werden, es ist jedoch möglich, den A- und U-Gehalt durch Verwendung von Codons zu vermindern, die weniger A- und/oder U-Nucleotide enthalten. Zum Beispiel:

Die Codons für Phe können von UUU zu UUC verändert werden;

- 5 die Codons für Leu können von UUA, CUU oder CUA zu CUC oder CUG verändert werden;

die Codons für Ser können von UCU oder UCA oder AGU zu UCC, UCG oder AGC verändert werden;

das Codon für Tyr kann von UAU zu UAC verändert werden;

- 10 das Stop-Codon UAA kann zu UAG oder UGA verändert werden;

das Codon für Cys kann von UGU zu UGC verändert werden;

das Codon His kann von CAU zu CAC verändert werden;

das Codon für Gln kann von CAA zu CAG verändert werden;

die Codons für Ile können von AUU oder AUA zu AUC verändert werden;

- 15 die Codons für Thr können von ACU oder ACA zu ACC oder ACG verändert werden;

das Codon für Asn kann von AAU zu AAC verändert werden;

das Codon für Lys kann von AAA zu AAG verändert werden;

die Codons für Val können von GUU oder GUA zu GUC oder GUG verändert werden;

das Codon für Asp kann von GAU zu GAC verändert werden;

- 20 das Codon für Glu kann von GAA zu GAG verändert werden.

Im Falle der Codons für Met (AUG) und Trp (UGG) besteht hingegen keine Möglichkeit der Sequenzmodifikation.

- 25 Die vorstehend aufgeführten Substitutionen können selbstverständlich einzeln aber auch in allen möglichen Kombinationen zur Erhöhung des G/C-Gehalts der modifizierten mRNA gegenüber der ursprünglichen Sequenz verwendet werden. So können beispielsweise alle in der ursprünglichen (Wildtyp-) Sequenz auftretenden Codons für Thr zu ACC (oder ACG) verändert werden. Vorzugsweise werden jedoch Kombinationen der vorstehenden Substitutionsmöglichkeiten genutzt, z.B.:
- 30

Substitution aller in der ursprünglichen Sequenz für Thr codierenden Codons zu ACC (oder ACG) und Substitution aller ursprünglich für Ser codierenden Codons zu UCC (oder UCG oder AGC);

Substitution aller in der ursprünglichen Sequenz für Ile codierenden Codons zu AUC und

- 5 Substitution aller ursprünglich für Lys codierenden Codons zu AAG und Substitution aller ursprünglich für Tyr codierenden Codons zu UAC;

Substitution aller in der ursprünglichen Sequenz für Val codierenden Codons zu GUC (oder GUG) und Substitution aller ursprünglich für Glu codierenden Codons zu GAG und Substitution aller ursprünglich für Ala codierenden Codons zu GCC (oder GCG) und

- 10 Substitution aller ursprünglich für Arg codierenden Codons zu CGC (oder CGG);

Substitution aller in der ursprünglichen Sequenz für Val codierenden Codons zu GUC (oder GUG) und Substitution aller ursprünglich für Glu codierenden Codons zu GAG und Substitution aller ursprünglich für Ala codierenden Codons zu GCC (oder GCG) und Substitution aller ursprünglich für Gly codierenden Codons zu GGC (oder GGG) und

- 15 Substitution aller ursprünglich für Asn codierenden Codons zu AAC;

Substitution aller in der ursprünglichen Sequenz für Val codierenden Codons zu GUC (oder GUG) und Substitution aller ursprünglich für Phe codierenden Codons zu UUC und Substitution aller ursprünglich für Cys codierenden Codons zu UGC und Substitution aller ursprünglich für Leu codierenden Codons zu CUG (oder CUC) und Substitution aller

20 ursprünglich für Gln codierenden Codons zu CAG und Substitution aller ursprünglich für Pro codierenden Codons zu CCC (oder CCG);

usw.

- Vorzugsweise wird der G/C-Gehalt des für das antigene Peptid bzw. Polypeptid codierenden Bereichs (bzw. jedes anderen gegebenenfalls vorhandenen weiteren Abschnitts) der
- 25 mRNA um mindestens 7%-Punkte, mehr bevorzugt um mindestens 15%-Punkte, besonders bevorzugt um mindestens 20%-Punkte gegenüber dem G/C-Gehalt des codierten Bereichs der für das entsprechende Peptid bzw. Polypeptid codierenden Wildtyp-mRNA erhöht.

Besonders bevorzugt ist es in diesem Zusammenhang, den G/C-Gehalt der derart modifizierten mRNA, insbesondere im für das mindestens eine antigene Peptid bzw. Polypeptid codierenden Bereich, im Vergleich zur Wildtyp-Sequenz maximal zu erhöhen.

- 5 Eine weitere bevorzugte Modifikation einer gegebenenfalls in der vorliegenden Erfindung gekennzeichneten Vakzine enthaltenen mRNA beruht auf der Erkenntnis, dass die Translationseffizienz auch durch eine unterschiedliche Häufigkeit im Vorkommen von tRNAs in Zellen bestimmt wird. Sind daher in einer RNA-Sequenz vermehrt sogenannte "seltene" Codons vorhanden, so wird die entsprechende mRNA deutlich schlechter translatiert als
10 in dem Fall, wenn für relativ "häufige" tRNAs codierende Codons vorhanden sind.

Somit wird erfindungsgemäß in der mRNA (welche in der Vakzine enthalten sein kann), der für das Antigen (d.h. das antigen wirksame Peptid bzw. Polypeptid) codierende Bereich gegenüber dem entsprechenden Bereich der Wildtyp-mRNA derart verändert, dass
15 mindestens ein Codon der Wildtyp-Sequenz, das für eine in der Zelle relativ seltene tRNA codiert, gegen ein Codon ausgetauscht, das für eine in der Zelle relativ häufige tRNA codiert, welche die gleiche Aminosäure trägt wie die relativ seltene tRNA.

Durch diese Modifikation werden die RNA-Sequenzen derart modifiziert, dass Codons
20 eingefügt werden, für die häufig vorkommende tRNAs zur Verfügung stehen.

Welche tRNAs relativ häufig in der Zelle vorkommen und welche demgegenüber relativ selten sind, ist einem Fachmann bekannt; vgl. bspw. Akashi, Curr. Opin. Genet. Dev. 2001, 11(6): 660-666.

25

Durch diese Modifikation können erfindungsgemäß alle Codons der Wildtyp-Sequenz, die für eine in der Zelle relativ seltene tRNA codieren, jeweils gegen ein Codon ausgetauscht werden, das für eine in der Zelle relativ häufige tRNA codiert, welche jeweils die gleiche Aminosäure trägt wie die relativ seltene tRNA.

30

Besonders bevorzugt ist es, den in der wie vorstehend beschriebenen mRNA erhöhten, insbesondere maximalen, sequenziellen G/C-Anteil mit den "häufigen" Codons zu ver-

knüpfen, ohne die Aminosäuresequenz des durch den codierenden Bereich der mRNA codierten antigenen Peptids bzw. Polypeptids (ein oder mehrere) zu verändern. Diese bevorzugte Ausführungsform stellt eine besonders effizient translatierte und stabilisierte mRNA für die erfindungsgemäße Vakzine bereit.

5

Vorzugsweise enthält das erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel neben der chemisch modifizierten RNA sowie die erfindungsgemäße Vakzine neben dem immunstimulierenden Mittel einen pharmazeutisch verträglichen Träger und/oder ein pharmazeutisch verträgliches Vehikel. Entsprechende Wege zur geeigneten Formulierung und Herstellung
10 des erfindungsgemäßen immunstimulierenden Mittels und der Vakzine sind bei "Remington's Pharmaceutical Sciences" (Mack Pub. Co., Easton, PA, 1980) offenbart, das vollinhaltlich Bestandteil der Offenbarung der vorliegenden Erfindung ist. Für die parenterale Verabreichung kommen als Trägerstoffe bspw. steriles Wasser, sterile Kochsalzlösungen, Polyalkylenglykole, hydrogenierte Naphthalene und insbesondere biokompatible Lactidpolymere, Lactid/Glycolidcopolymer oder Polyoxyethylen-/Polyoxypropylencopolymere in
15 Betracht. Erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel und Vakzine können Füllsubstanzen oder Substanzen, wie Lactose, Mannitol, Substanzen zur kovalenten Anknüpfung von Polymeren, wie z.B. Polyethylenglykol an erfindungsgemäße antigene Haptene, Peptide oder Polypeptide, Komplexierung mit Metallionen oder Einschluss von Materialien in
20 oder auf besondere Präparationen von Polymerverbindungen, wie z.B. Polylactat, Polyglykolsäure, Hydrogel oder auf Liposomen, Mikroemulsion, Micellen, unilamellare oder multilamellare Vesikel, Erythrozyten-Fragmente oder Sphäroblasten, enthalten. Die jeweiligen Ausführungsformen des immunstimulierenden Mittels und der Vakzine werden abhängig vom physikalischen Verhalten, beispielsweise in Hinblick auf die Löslichkeit, die Stabilität,
25 Bioverfügbarkeit oder Abbaubarkeit gewählt. Kontrollierte oder konstante Freisetzung der erfindungsgemäßen Wirkstoffkomponenten in der Vakzine bzw. im immunstimulierenden Mittel schließt Formulierungen auf der Basis lipophiler Depots ein (z.B. Fettsäuren, Wachse oder Öle). Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden auch Beschichtungen erfindungsgemäßer immunstimulierender Substanzen und Vakzinsubstanzen oder -
30 zusammensetzungen, enthaltend solche Substanzen, nämlich Beschichtungen mit Polymeren offenbart (z.B. Polyoxamere oder Polyoxamine). Weiterhin können erfindungsgemäße immunstimulierende bzw. Vakzinsubstanzen oder -zusammensetzungen protektive Be-

schichtungen, z.B. Proteaseinhibitoren oder Permeabilitätsverstärker, aufweisen. Bevorzugte Träger sind typischerweise wässrige Trägermaterialien, wobei Wasser zur Injektion (WFI) oder Wasser, gepuffert mit Phosphat, Citrat, HEPES oder Acetat usw. verwendet wird, und der pH typischerweise auf 5,0 bis 8,0, vorzugsweise 6,5 bis 7,5, eingestellt wird.

- 5 Der Träger bzw. das Vehikel wird zusätzlich vorzugsweise Salzbestandteile enthalten, z.B. Natriumchlorid, Kaliumchlorid oder andere Komponenten, welche die Lösung bspw. isotonisch machen. Weiterhin kann der Träger bzw. das Vehikel neben den vorstehend genannten Bestandteilen zusätzliche Komponenten, wie humanes Serumalbumin (HSA), Polysorbat 80, Zucker oder Aminosäuren, enthalten.

10

Die Art und Weise der Verabreichung und die Dosierung des erfindungsgemäßen immunstimulierenden Mittels und der erfindungsgemäßen Vakzine hängen von der Art der zu bekämpfenden Erkrankung, ggf. deren Stadium, dem Antigen (bei der Vakzine) wie auch dem Körpergewicht, dem Alter und dem Geschlecht des Patienten ab.

15

Die Konzentration der chemisch modifizierten RNA wie auch der gegebenenfalls in der Vakzine enthaltenden codierenden Nucleinsäure in derartigen Formulierungen kann daher innerhalb eines weiten Bereichs von 1 µg bis 100 mg/ml variieren. Das erfindungsgemäße immunstimulierende Mittel als auch die erfindungsgemäße Vakzine werden vorzugsweise

20 parenteral, bspw. intravenös, intraarteriell, subkutan, intramuskulär, dem Patienten verabreicht. Ebenso ist es möglich, das immunstimulierende Mittel oder die Vakzine topisch oder oral zu verabreichen.

- 25 Somit wird erfindungsgemäß auch ein Verfahren zur Prävention und/oder Behandlung der vorstehend genannten Erkrankungen bereitgestellt, welches das Verabreichen des erfindungsgemäßen immunstimulierenden Mittels oder der erfindungsgemäßen Vakzine an einen Patienten, insbesondere an einen Menschen, umfasst.

Die Figuren zeigen:

30

Fig. 1 zeigt Ergebnisse zur Stimulation der Reifung von dendritischen Zellen (DC) der Maus durch erfindungsgemäße chemisch modifizierte RNA im Vergleich mit mRNA, mit

Protamin assoziierter mRNA und DNA. DC der Maus wurden mit 10 µg/ml mRNA (pp65 für pp65-mRNA, β-Gal für β-Galaktosidase-mRNA), durch Protamin stabilisierte mRNA (Protamin+pp65, Protamin+β-Gal), DNA (CpG DNA 1668, DNA 1982 und CpG DNA 1826) sowie Phosphorthioat-modifizierte RNA (RNA 1668, RNA 1982 und RNA 1826) stimuliert und die DC-Aktivierung durch Messung der Freisetzung von IL-12 (Fig. 1A) und IL-6 (Fig. 1B) mittels Cytokin-ELISA bestimmt. Als Negativkontrollen diente in beiden Versuchsreihen jeweils Medium ohne Nucleinsäureproben sowie Medium mit zugesetztem Protamin. Als Positivvergleich wurde Lipopolysaccharid (LPS) verwendet. Die Oligodesoxyribonucleotide (ODN) CpG DNA 1668 und CpG DNA 1826 enthalten jeweils ein CpG-Motiv. Von derartigen ODN ist bekannt, dass sie eine Stimulation von DC hervorrufen (vgl. US-Patent 5,663,153). Das ODN DNA 1982 weist die gleiche Sequenz wie CpG DNA 1826 auf, mit der Ausnahme, dass durch einen Austausch von C nach G das CpG-Motiv entfernt wurde. Die durch Phosphorthioat-Modifizierung stabilisierten erfindungsgemäßen Oligoribonucleotide CpG RNA 1668, RNA 1982 und CpG RNA 1826 entsprechen in ihrer Sequenz den vorstehend genannten Vergleichs-ODN der jeweiligen Erkennungsziffer. Im Vergleich zu normaler mRNA zeigen die Protamin-stabilisierten mRNA-Spezies nur eine schwache Aktivierung der DC. Eine im Vergleich dazu sehr viel stärkere Interleukin-Freisetzung wird jedoch in beiden Experimenten durch die erfindungsgemäßen Phosphorthioat-modifizierten Oligoribonucleotide hervorgerufen, deren Werte mit demjenigen der Positivkontrolle (LPS) vergleichbar sind. Im Vergleich zu Protamin-assoziierter mRNA ergibt sich bei der Stimulation durch Phosphorthioat-modifizierte Oligoribonucleotide eine mehr als verdoppelte Freisetzung von IL-12 bzw. IL-6. Diese überraschend starke Interleukin-Freisetzung aufgrund der erfindungsgemäßen Oligoribonucleotide ist zudem unabhängig von CpG-Motiven, wie der Vergleich des erfindungsgemäßen Phosphorthioat-modifizierten Oligoribonucleotids RNA 1982 mit dem entsprechenden ODN DNA 1982 zeigt. Das ODN DNA 1982 ruft keine Interleukin-Freisetzung bei den DC hervor, während RNA 1982 eine Interleukin-Freisetzung bewirkt, die im Falle von IL-12 mit der Positivkontrolle LPS vergleichbar ist und bei IL-6 diese sogar übersteigt.

30

Fig. 2 zeigt die Ergebnisse der Bestimmung der Expression eines Oberflächenaktivierungsmarkers (CD86) bei DC, die mit den Proben, wie zuvor bei Fig. 1 beschrieben, be-

handelt wurden. Zur Bestimmung der CD86-Expression wurde 3 Tage nach der Behandlung der DC mit den angegebenen Proben ein Teil der DC mit einem anti-CD86-spezifischen monoklonalen Antikörper markiert und der Prozentanteil der CD86-exprimierenden Zellen mittels Durchflußcytometrie bestimmt. Eine signifikante CD86-Expression wird nur bei den Vergleichs-ODN, die ein CpG-Motiv aufweisen, und den erfindungsgemäßen Phosphorthioat-modifizierten RNA-Spezies beobachtet. Sämtliche Werte der Nucleinsäurestimulanzen lagen jedoch deutlich unterhalb der Positivkontrolle (LPS). Des weiteren bestätigt die CD86-Bestimmung, dass die durch erfindungsgemäße Phosphorthioat-modifizierte RNA hervorgerufene DC-Aktivierung im Gegensatz zu DNA-Spezies unabhängig von CpG-Motiven ist: Während das CpG-freie ODN DNA 1982 keine CD86-Expression hervorruft, wird beim entsprechenden Phosphorthioat-modifizierten Oligoribonucleotid RNA 1982 bei 5% der DC eine CD86-Expression nachgewiesen.

Fig. 3 zeigt die Ergebnisse eines Alloreaktionstest unter Verwendung von DC, die *in vitro* mit den auf der x-Achse angegebenen Proben (vgl. auch Fig. 1) aktiviert wurden. 3 Tage nach der Stimulation wurden die DC zu frischen Milzzellen aus einem allogenen Tier gegeben und sechs Tage später in einem Cytotoxizitätstest verwendet, bei dem die Freisetzung von ^{51}Cr bei Zielzellen (P 815) im Vergleich zu Kontrollzellen (EL 4) gemessen wurde. Die Ziel- bzw. Kontrollzellen wurden in einer konstanten Menge ausplattiert und dann 4 Stunden mit jeweils drei verschiedenen Verdünnungen der mit den DC kokultivierten Milzzellen (Effektorzellen) inkubiert, so dass sich ein Verhältnis von Effektorzellen (E) zu Zielzellen (bzw. Kontrollzellen) (T) von 41:1, 9:1 bzw. 2:1 ergab. Auf der y-Achse ist die spezifische Abtötung in Prozent angegeben, die wie folgt berechnet wird:

$$\left[\frac{\text{(gemessene freigesetzte Radioaktivität - spontan freigesetzte Radioaktivität)}}{\text{(maximale Freisetzung von Radioaktivität - spontan freigesetzte Radioaktivität)}} \right] \times 100.$$

Mit Protamin assoziierter β -Galaktosidase-mRNA stimulierte DC vermögen bei der geringsten Verdünnung nur eine 20%ige spezifische Abtötung von Zielzellen durch die Effektorzellen hervorzurufen. Durch Phosphorthioat-modifiziertes Oligoribonucleotid stimulierte DC bewirken demgegenüber bei der geringsten Verdünnung eine fast 60%ige, also etwa verdreifachte, spezifische Abtötung der Zielzellen durch die Effektorzellen. Dieser Wert ist vergleichbar mit dem der Positivkontrolle (LPS) und einem ein CpG-Motiv enthaltenden

Vergleichs-ODN (CpG DNA 1668). Demgegenüber ist ein ODN ohne CpG-Motiv (DNA 1982) inaktiv, was die Ergebnisse aus den vorhergehenden Experimenten gemäß Fig. 1 und Fig. 2 bestätigt. pp65-mRNA (ohne Protamin), β -Galaktosidase-mRNA (ohne Protamin) sowie Protamin und Medium alleine bewirken keine spezifische Abtötung.

5

Fig. 4 zeigt Ergebnisse zur Stimulation der Reifung von dendritischen Zellen (DC) von B6-Mäusen im Vergleich zu MyD88-Knock-Out-Mäusen durch erfindungsgemäße chemisch modifizierte Oligoribonucleotide und Vergleichs-ODN. Als Negativkontrolle diente die Stimulation nur mit Medium. Die Stimulation erfolgte, wie zuvor bei Fig. 1 beschrieben, und die DC-Aktivierung wurde durch Messung der Freisetzung von IL-12 (Fig. 4A) und IL-6 (Fig. 4B) mittels Cytokin-ELISA bestimmt. In Fig. 4A ist auf der y-Achse die IL-12-Konzentration in ng/ml aufgetragen, während in Fig. 4B auf der y-Achse die Absorption bei 405 nm (Absorptionsmaximum des Nachweisreagenz) aufgetragen ist, was der Interleukin-Konzentration direkt proportional ist. In MyD88-Mäusen ist das Protein MyD88, ein Protein aus der Signalkaskade der sog. "toll-like receptors" (TLR), ausgeschaltet. Von TLR-9 ist bspw. bekannt, dass er die Aktivierung von DC durch CpG-DNA vermittelt. DC von B6-Wildtyp-Mäusen werden durch die erfindungsgemäßen Phosphorthioat-modifizierten Oligoribonucleotide CpG RNA 1688 und RNA 1982 sowie erwartungsgemäß durch das Vergleichs-ODN CpG DNA 1668 aktiviert. Das ODN DNA 1982 (ohne CpG-Motiv) ist wiederum unwirksam. Im Gegensatz dazu kann keine der Proben eine nennenswerte Freisetzung von IL-12 oder IL-6 bei DC aus MyD88-Mäusen hervorrufen. Daher scheint MyD88 zur Aktivierung von DC durch die erfindungsgemäßen chemisch modifizierten Oligoribonucleotide und durch CpG-ODN erforderlich zu sein.

Fig. 5 zeigt Ergebnisse der Stimulation von DC durch das erfindungsgemäße chemisch modifizierte Oligoribonucleotid RNA 1982 und zwei Vergleichs-ODN, die vor dem Einsatz zur DC-Aktivierung für 2, 26 oder 72 h bei 37°C mit Medium inkubiert wurden, das nicht RNase-frei war. Zum Vergleich wurde jeweils eine Probe ohne vorherige Inkubation verwendet (t=0). Die mit "1:1" gekennzeichneten Proben waren gegenüber den jeweils anderen Proben 1:1 mit Puffer verdünnt. Die DC-Aktivierung wurde wiederum durch Bestimmung der Freisetzung von IL-12 (Fig. 5A) und IL-6 (Fig. 5B) mittels Cytokin-ELISA gemessen. Die DC-Aktivierung durch CpG-DNA ist von einer vorherigen Inkuba-

30

tion mit Medium unabhängig. Erwartungsgemäß führt das Vergleichs-ODN ohne CpG-Motiv zu keiner Interleukin-Freisetzung. Beim erfindungsgemäßen Oligoribonucleotid RNA 1982 wird ohne Inkubation mit Medium ($t=0$) eine deutliche Interleukin-Freisetzung gemessen. Bereits nach 2 h Inkubation bei 37°C mit nicht-RNase-freiem Medium wird
5 beim Stimulationsversuch mit dem erfindungsgemäßen Oligoribonucleotid keine nennenswerte Interleukin-Freisetzung mehr beobachtet.

Fig. 6 zeigt das Ergebnis eines ähnlichen Experiments, wie es in Fig. 5B dargestellt wird, jedoch wurde ein genauerer zeitlicher Verlauf der Auswirkung des RNA-Abbaus auf die
10 DC-Stimulation aufgenommen: Das erfindungsgemäße chemisch modifizierte Oligoribonucleotid RNA 1982 wurde wiederum zur Stimulation von DC verwendet und die Aktivierung der DC durch die Messung der IL-6-Freisetzung bestimmt. Vor der Stimulation wurde das Oligoribonucleotid für 15, 30 45 oder 60 min, wie vorstehend bei Fig. 5 beschrieben, mit nicht-RNase-freiem Medium inkubiert. Als Vergleich diente wieder eine nicht mit
15 dem Medium inkubierte Probe ($t=0$). Als Positivkontrolle wurde das ODN CpG DNA 1668 sowie als Negativkontrolle Medium allein verwendet. Ohne vorherige Inkubation mit nicht-RNase-freiem Medium ergibt sich wieder eine starke DC-Aktivierung durch die erfindungsgemäße chemisch modifizierte RNA, wie die IL6-Konzentration von über 5 ng/ml belegt. Dieser Wert sinkt innerhalb einer Stunde Inkubation unter RNA-
20 Degradationsbedingungen auf etwas über 2 ng/ml ab. Dies zeigt, dass die chemisch modifizierte RNA unter physiologischen Bedingungen zwar sehr viel schneller als DNA-Spezies abgebaut wird, die Halbwertszeit jedoch offensichtlich ausreichend lang ist, damit die erfindungsgemäße immunstimulierende Wirkung entfaltet werden kann.

25 Fig. 7 zeigt Ergebnisse zur Stimulation der Proliferation von B-Zellen der Maus mit erfindungsgemäßen Phosphorthioat-modifizierten Ribonucleotiden (CpG RNA 1668, CpG RNA 1826 und RNA 1982) im Vergleich zu DNA-Spezies (mit CpG-Motiv: CpG DNA 1668 und CpG DNA 1826; ohne CpG-Motiv: DNA 1982). Als Kontrolle diente Medium allein ohne Nucleinsäure-Probe. ODN mit CpG-Motiv führen mit fast 90 % proliferierenden B-Zellen zu einer sehr starken B-Zell-Proliferation. Auch das ODN DNA
30 1982 (ohne CpG-Motiv), welches sich hinsichtlich der DC-Stimulation als inaktiv erwiesen hat (vgl. Fig. 1 bis 5) rief eine moderate B-Zell-Proliferation (fast 20 % proliferierende

Zellen) hervor. Im Gegensatz dazu führte die Stimulation der B-Zellen durch die erfindungsgemäßen chemisch modifizierten Oligoribonucleotide zu einem Prozentanteil proliferierender B-Zellen, der im Bereich oder sogar unterhalb der Negativkontrolle (in jedem Fall < 10% proliferierende Zellen) liegt.

5

Fig. 8 zeigt Ergebnisse einer Untersuchung *in vivo* zur Auswirkung von erfindungsgemäßer chemisch modifizierter RNA im Vergleich mit DNA auf die Milz von Mäusen. Diesen wurde die jeweilige Nucleinsäure-Spezies zusammen mit einem Antigengemisch (Peptid TPHARGL ("TPH") + β -Galaktosidase (" β -Gal") subkutan injiziert. Nach 10 Tagen wurden die Milzen der Mäuse entnommen und gewogen. Auf der y-Achse ist das Milz-Gewicht in g aufgetragen. Die Balken zeigen jeweils den Mittelwert von zwei unabhängigen Experimenten. Während das Milz-Gewicht bei den mit erfindungsgemäßer chemisch modifizierter RNA + Antigengemisch behandelten Mäusen gegenüber der Kontrolle (PBS) mit etwa 0,08 g unverändert ist, zeigt sich bei Mäusen, denen DNA + Antigengemisch injiziert wurde, eine ausgeprägte Splenomegalie, was sich in einem durchschnittlichen Gewicht der Milz von über 0,1 g zeigt.

10

15

Die folgenden Beispiele erläutern die vorliegende Erfindung näher, ohne sie einzuschränken.

20

Beispiele

Zur Ausführung der nachstehenden Beispiele wurden die folgenden Materialien und Methoden verwendet:

25

1. Zellkultur

Dendritische Zellen (DC) wurden durch Ausspülen des Hinterbeinknochenmarks von BLAB/c-, B6- oder MyD88-Knock-Out-Mäusen mit Medium, Behandlung mit Gey'scher Lösung (zur Lyse der roten Blutzellen) und Filtration durch ein Zellsieb erhalten. Die Zellen wurden dann für 6 Tage in IMDM, enthaltend 10 % Hitze-inaktiviertes fötales Kälberserum (FCS; von PAN), 2 mM L-Glutamin (von Bio Whittaker), 10 mg/ml Streptomycin,

30

- 10 U/ml Penicillin (PEN-STREP, von Bio Whittaker) und 51 U/ml GM-CFS (im Folgenden als "Komplettmedium" bezeichnet), in Kulturplatten mit 24 Vertiefungen kultiviert. Nach zwei bzw. vier Tagen wurde das Medium jeweils entfernt und ein äquivalentes Volumen von frischem Medium, welches die vorstehend angegebene Konzentration an GM-CFS enthielt, wurde zugegeben.

2. Aktivierung der DC

- 10 Nach 6 Tagen wurden die DC in eine Kulturplatte mit 96 Vertiefungen überführt, wobei in jede Vertiefung 200.000 Zellen in 200 µl Komplettmedium gegeben wurden. Die Nucleinsäureproben (DNA, chemisch modifizierte RNA, mRNA oder Protamin-stabilisierte RNA) wurden bei einer Konzentration von 10 µg/ml hinzugefügt.

3. RNA-Abbaubedingungen

- Es wurden jeweils 5 µl der entsprechenden Nucleinsäureproben (2 µg/µl DNA, nicht-modifizierte RNA oder erfindungsgemäß chemisch modifizierte RNA) in 500 µl Komplettmedium und für 2, 26 oder 72 h bzw. 15, 30, 45 oder 60 min bei 37°C inkubiert. Als Kontrolle diente eine nicht inkubierte Probe (t=0). Anschließend wurden DC mit den Proben, wie unter vorstehendem Punkt 2. beschrieben, stimuliert.

4. Cytokin-ELISA

- 25 17 Stunden nach der Zugabe der jeweiligen Stimulans wurden 100 µl des Überstands entfernt und 100 µl frisches Medium zugegeben. ELISA-Platten (Nunc Maxisorb) wurden über Nacht mit Fängerantikörpern (Pharmingen) in Bindungspuffer (0,02% NaN₃, 15 mM Na₂CO₃, 15 mM NaHCO₃, pH 9,7) beschichtet. Unspezifische Bindungsstellen wurden mit Phosphat-gepufferter Salzlösung (PBS), enthaltend 1% Rinderserumalbumin (BSA), abgesättigt. Danach wurden jeweils in eine so behandelte Vertiefung 100 µl des jeweiligen Zellkulturüberstands gegeben und 4 Stunden bei 37° C inkubiert. Biotinylierter Antikörper wurde nach 4 Waschschritten mit PBS, enthaltend 0,05% Tween-20, zugegeben. Die

Nachweisreaktion wurde durch Zugabe von Streptavidin-gekoppelter Rettichperoxidase (HRP-Streptavidin) und dem Substrat ABTS (Messung der Absorption bei 405 nm) gestartet.

5 5. Durchflußcytometrie

Zur Einfarb-Durchflußcytometrie wurden 2×10^5 Zellen für 20 Minuten bei 4° C in PBS, enthaltend 10% FCS, mit FITC-konjugiertem, monoklonalem anti-CD86-Antikörper (Becton Dickinson) bei geeigneter Konzentration inkubiert. Nach zweimaligem Waschen und
10 Fixierung in 1% Formaldehyd wurden die Zellen mit einem FACScalibur-Durchflußcytometer (Becton Dickinson) und der CellQuestPro-Software analysiert.

6. Alloreaktionstest durch ^{51}Cr -Freisetzung

15 Milzzellen von B6-Mäusen (C57bl6, H-2^d-Haplotyp) wurden mit den gemäß vorstehendem Punkt 2. stimulierten DC von BLAB/c-Mäusen (H-2^d-Haplotyp) in einem Verhältnis von 1:3 für 5 Tage inkubiert und als Effektorzellen verwendet.

Jeweils 5.000 EL-4-Zellen (als Kontrolle) bzw. P815-Zellen (als Zielzellen) wurden in Platten mit 96 Vertiefungen in IMDM mit 10% FCS kultiviert und für eine Stunde mit ^{51}Cr
20 beladen. Die ^{51}Cr -markierten Zellen wurden mit den Effektorzellen für 5 Stunden inkubiert (Endvolumen 200 µl). Es wurden jeweils 3 verschiedene Verhältnisse von Effektor- bzw. Kontrollzellen zu Zielzellen (E/T) untersucht: E/T = 41, 9 oder 2. Zur Bestimmung der spezifischen Abtötung wurden 50 µl des Überstands abgenommen und die Radioaktivität unter Verwendung einer Festphasen-Szintillationsplatte (Luma Plate-96, Packard) und
25 einem Szintillationszähler für Microtiterplatten (1450 Microbeta Plus) gemessen. Der Prozentanteil der ^{51}Cr -Freisetzung wurde anhand der Menge des in das Medium freigesetzten ^{51}Cr (A) bestimmt und mit der spontanen ^{51}Cr -Freisetzung von Zielzellen (B) und dem ^{51}Cr -Gesamtgehalt von Zielzellen (C), die mit 1% Triton-X-100 lysiert wurden, verglichen,
30 wobei sich die spezifische Abtötung aus der folgenden Formel ergibt: % Abtötung = $[(A - B)/(C - B)] \times 100$.

7. B-Zell-Proliferationstest

- 5 Frische Milzellen einer Maus wurden zweimal mit 10 ml PBS gewaschen und in einer Konzentration von 1×10^7 Zellen/ml in PBS aufgenommen. Es wurde CSFE (FITC-markiert) in einer Endkonzentration von 500 nM zugegeben und für 3 Minuten inkubiert. Anschließend wurde zweimal mit Medium gewaschen. Es wurde jeweils eine ungefärbte und eine gefärbte Probe im Durchflußcytometer (FACScalibur; Becton Dickinson) untersucht. Zu 200.000 Zellen/Vertiefung einer Kulturplatte mit 96 Vertiefungen (U-förmiger Boden) in 200 µl Medium wurde CpG DNA oder RNA in einer Konzentration von 10 µg/ml gegeben. An Tag 4 nach der Stimulation wurden die Zellen mit B220 CyChrome und CD 69 PE gefärbt und im FACS analysiert.

8. In vivo-Untersuchung zur Splenomegalie

- 15 50 µg chemisch modifizierte RNA oder Vergleichs-ODN wurden subkutan mit einem Antigengemisch (100 µg Peptid TPHARGL + 100 µg β-Galaktosidase) in jeweils 200 µl PBS in BALB/c-Mäuse (für jede Probe wurden zwei Mäuse verwendet) injiziert. Nach 10 Tagen wurden die Milzen der Mäuse entnommen und gewogen.

20 9. Sequenzen der verwendeten Nucleinsäuren

Oligodesoxyribonucleotide (ODN):

- CpG DNA 1668: 5'-TCCATGACGTTCTGATGCT-3'
 25 CpG DNA 1826: 5'-TCCATGACGTTCTGACGTT-3'
 DNA 1982: 5'-TCCAGGACTTCTCTCAGGTT-3'

Oligoribonucleotide (Phosphorothioat-modifiziert):

- 30 CpG RNA 1668: 5'-UCCAUGACGUUCCUGAUGCU-3'
 CpG RNA 1826: 5'-UCCAUGACGUUCCUGACGUU-3'
 RNA 1982: 5'-UCCAGGACUUCUCUCAGGUU-3'

Beispiel 1

Um das Vermögen verschiedener Nucleinsäure-Spezies zur Stimulation der Reifung von DC zu bestimmen, wurden DC aus BALB/c-Mäusen gewonnen und mit den unter vorstehendem Punkt 6 angegebenen Oligonucleotiden behandelt. Als weitere Proben wurde jeweils mittels Protamin stabilisierte β -Galaktosidase-mRNA und pp65-RNA verwendet. Mittels ELISA wurde die Freisetzung von IL-12 bzw. IL-6 durch die stimulierten DC bestimmt. Die Stimulierung von DC mittels Protamin-assoziiierter mRNA ergab eine schwache Interleukin-Freisetzung. Im Gegensatz dazu war die durch die erfindungsgemäßen Phosphorthioat-modifizierten RNA-Spezies hervorgerufene Interleukin-Freisetzung erheblich größer und war sogar mit der Positivkontrolle (Stimulation durch LPS) vergleichbar (Fig. 1A und 1B). Die Vergleichs-ODN, die ein CpG-Motiv enthielten, zeigten eine erwartete Interleukin-Freisetzung durch die DC, wobei jedoch die Interleukin-Freisetzung gegenüber dem Wert, der durch die erfindungsgemäße RNA-Spezies entsprechender Sequenz bewirkt wurde, deutlich geringer war (Fig. 1A und 1B).

Um die mittels Cytokin-ELISA demonstrierte Induktion der Reifung der DC zu bestätigen, wurde mittels Durchflußcytometrie die Expression eines für reife DC spezifischen Oberflächenmarkers (CD86) bestimmt. Erfindungsgemäße Phosphorthioat-modifizierte RNA-Spezies, nicht jedoch mRNA oder Protamin-assoziierte mRNA, konnten eine deutliche CD86-Expression hervorrufen (Fig. 2).

Beispiel 2

Des weiteren wurde untersucht, ob die durch die chemisch modifizierten, immunstimulierend wirksamen RNA-Spezies aktivierten DC in der Lage sind, eine Immunantwort in einem allogenen System hervorzurufen (Fig. 3). Dazu wurden Milzzellen der Maus (B6) mit den stimulierten DC aktiviert und als Effektorzellen mit allogenen Zielzellen (P815) zusammengebracht, wobei die Abtötung der Zielzellen mit Hilfe eines ^{51}Cr -Freisetzungstest bestimmt wurde. Dabei wurden jeweils drei verschiedene Verdünnungen von Effektorzellen mit einer konstanten Anzahl von Zielzellen in Kontakt gebracht.

Phosphorthioat-modifizierte RNA ist danach im Vergleich zu Protamin-stabilisierter mRNA sehr viel stärker in der Lage, die Reifung von DC zu aktivierten Zellen hervorzurufen, die eine Immunantwort durch Effektorzellen starten können. Überraschenderweise ist dabei festzustellen, dass durch Phosphorthioat-RNA aktivierte DC eine Immunantwort auslösen können, die ebenso stark ist wie diejenige, die durch ODN, welche CpG-Motive aufweisen, ausgelöst wird.

Beispiel 3

Es ist bekannt, dass die Aktivierung von DC durch CpG-DN über TLR-9 (engl. "toll-like receptor 9") vermittelt wird (Kaisho et al., Trends Immunol. 2001, 22(2): 78-83). Es wurde daher untersucht, ob auch an der durch die erfindungsgemäße chemisch modifizierte, immunstimulierend wirksame RNA bewirkten DC-Aktivierung ebenfalls die TLR-Signalkaskade beteiligt ist. Dazu wurde wiederum anhand der Freisetzung von IL-12 und IL-6 die Aktivierung von DC aus B6-Wildtyp-Mäusen mit der von DC aus B6-Mäusen, denen das Protein MyD88 fehlt, verglichen. MyD88 ist an der TLR-9-Signalkaskade beteiligt. Die starke Freisetzung von IL-12 und IL-6 von DC der B6-Wildtyp-Mäuse bestätigte die Ergebnisse des Beispiels 1 (vgl. Fig. 4A und B, schwarze Balken). Im Gegensatz dazu führte die Stimulation von DC aus MyD88-Knock-Out-Mäusen mit den gleichen Proben zu keiner Aktivierung (vgl. Fig. 4A und B, weiße Balken). Diese Ergebnisse zeigen, dass MyD88 und somit die TLR-9-Signalkaskade sowohl für die CpG-DNA-vermittelte als auch für die durch chemisch modifizierte RNA-vermittelte DC-Aktivierung erforderlich ist.

Beispiel 4

Um zu untersuchen, ob erfindungsgemäße chemisch modifizierte RNA einem zügigen Abbau unterworfen ist und daher nicht die Gefahr einer Persistenz im Organismus besteht, wurden erfindungsgemäße Oligoribonucleotide unter RNA-Degradationsbedingungen (37°C, unbehandeltes Medium, d.h. nicht-RNase-frei) für 2, 26 oder 72 h inkubiert und erst danach dem Stimulationstest mit DC zugeführt. Bereits nach einer zweistündigen Inkubation unter RNA-Degradationsbedingungen wurde bei der er-

findungsgemäßen chemisch modifizierten RNA keine Aktivierung der DC mehr beobachtet, wie durch die fehlende IL-12- (Fig. 5A) und IL-6-Freisetzung (Fig. 5B) gezeigt wird. Im Gegensatz dazu hat die vorausgehende Inkubation von CpG-DNA-Spezies keinen Einfluß auf deren Wirksamkeit bei der DC-Aktivierung. Dies zeigt, dass die erfindungsgemäße chemisch modifizierte RNA bereits nach relativ kurzer Zeit abgebaut wird, was eine Persistenz im Organismus, die bei DNA auftreten kann, vermeidet.

Die erfindungsgemäße chemische modifizierte RNA wird jedoch nicht so schnell abgebaut, dass sie ihre immunstimulierende Wirkung nicht mehr entfalten kann. Um dies zu belegen, wurde das vorstehende Experiment mit einem erfindungsgemäßen Phosphorthioat-modifizierten Oligoribonucleotid (RNA 1982) wiederholt, jedoch die Inkubation unter RNA-Degradationsbedingungen nur für 15, 30, 45 und 60 min durchgeführt. Wie die Freisetzung von IL-6 durch die danach stimulierten DC zeigt, ergibt sich auch nach einer Stunde Inkubation unter RNA-Degradationsbedingungen eine deutliche DC-Aktivierung (Fig. 6).

Beispiel 5

Die Induktion einer Splenomegalie, die im wesentlichen auf eine starke Aktivierung der B-Zell-Proliferation zurückzuführen ist, stellt ein wesentliches Hindernis der Verwendung von CpG-DNA als immunstimulierendes Adjuvans in Vakzinen dar (vgl. Monteith et al., s.o.). Daher wurde mittels eines B-Zell-Proliferationstest überprüft, ob die erfindungsgemäße chemisch modifizierte RNA eine Auswirkung auf die B-Zell-Proliferation hat. Im B-Zell-Proliferationstest wurde ein erwarteter hoher Anteil proliferierender Zellen im Fall der Stimulation mit CpG-DNA nachgewiesen. Im Gegensatz dazu war überraschenderweise erfindungsgemäße chemisch modifizierte RNA (unabhängig von etwaig in der Sequenz vorhandener CpG-Motive) diesbezüglich völlig unwirksam (Fig. 7).

Um diese überraschend positive Eigenschaft der erfindungsgemäßen chemisch modifizierten RNA *in vivo* zu bestätigen, wurde eine Testvakzine, enthaltend ein erfindungsgemäßes Phosphorthioat-Oligoribonucleotid (RNA 1982) und ein Antigengemisch aus einem Peptid und β -Galaktosidase, hergestellt und Mäusen subkutan injiziert. Als Vergleich diente

eine entsprechende DNA-Testvakzine, die das gleiche Antigengemisch in Verbindung mit einem CpG-ODN (CpG DNA 1826) enthielt. Nach 10 Tagen wurden die Milzen der Mäuse entnommen und gewogen. Verglichen mit der Negativkontrolle (PBS) ergab sich bei mit der DNA-Testvakzine behandelten Mäusen eine signifikante Erhöhung des Milzgewichts. Im Gegensatz dazu wurde bei mit der erfindungsgemäßen RNA-Testvakzine behandelten Mäusen keine Splenomegalie festgestellt, da hier das Milzgewicht gegenüber der Negativkontrolle unverändert war (Fig. 8). Diese Ergebnisse zeigen, dass bei der erfindungsgemäßen Verwendung der chemisch modifizierten RNA als immunstimulierendes Mittel oder als Adjuvans in Vakzinen keine im Zusammenhang mit einer unerwünschten B-Zell-Proliferation stehenden Nebenwirkungen auftreten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass chemisch modifizierte RNA die Reifung von DC *in vitro* hervorruft. Die vorstehenden Beispiele belegen, dass chemisch modifizierte RNA, hier in Form kurzer (bspw. 20-merer) synthetischer Oligoribonucleotide (welche Phosphorthioat-modifiziert sind), unreife DC aktiviert und so deren Reifung hervorruft, wie es durch Bestimmung der spezifischen Cytokin-Freisetzung (Fig. 1) und der Expression von Oberflächenaktivierungsmarkern (Fig. 2) gezeigt wird. Die durch die chemisch modifizierte RNA hervorgerufene DC-Aktivierung ist deutlich stärker als diejenige, die durch ein Gemisch aus mRNA und der polykationischen Verbindung Protamin, von der bekannt ist, dass sie mit der RNA assoziiert und sie so vor Nucleasen schützt, hervorgerufen wird. Die durch Stimulation mit erfindungsgemäßer chemisch modifizierter RNA gereiften DC können eine Immunantwort durch Effektorzellen starten, wie ein Cr⁵¹-Freisetzungstest in einem allogenen System belegt (Fig. 3). Die DC-Aktivierung durch die erfindungsgemäße chemisch modifizierte RNA erfolgt vermutlich über eine TLR-vermittelte Signalkaskade (Fig. 4).

Von bakterieller DNA ist bekannt, dass sie aufgrund des Vorhandenseins von nicht-methylierten CG-Motiven immunstimulierend wirkt; vgl. US-Patent 5,663,153. Diese Eigenschaft von DNA kann bei DNA-Oligonucleotiden simuliert werden, die durch Phosphorthioat-Modifikation stabilisiert ist (US-Patent 6,239,116). Von RNA, die durch positiv geladene Proteine komplexiert ist, ist bekannt, dass sie eine immunstimulierende Wirkung aufweist (Riedl et al., 2002, s.o.). Es konnte durch die vorliegende Erfindung ge-

zeigt werden, dass RNA, die chemisch modifiziert ist, im Vergleich zu anderer, beispielsweise Protamin-komplexierter, RNA ein sehr viel wirksameres immunstimulierendes Agens ist. Im Gegensatz zu DNA sind bei derartigen chemisch modifizierten RNA-Oligonucleotiden keine CpG-Motive erforderlich. Freie Phosphorthioat-Nucleotide (nicht
5 gezeigt) sind im Gegensatz zu den 20-meren Ribonucleotiden nicht immunstimulierend wirksam.

Die chemisch modifizierte immunstimulierende RNA der vorliegenden Erfindung ist der immunstimulierenden DNA jedoch insbesondere dadurch überlegen, dass RNA schneller
10 abgebaut und so aus dem Körper des Patienten entfernt wird, weshalb das Risiko der Persistenz und des Hervorrufens von schweren Nebenwirkungen vermindert bzw. vermieden wird (Fig. 5 und 6). So kann die Verwendung von immunstimulierender DNA als Adjuvans für Vakzine die Bildung von Anti-DNA-Antikörpern hervorrufen, die DNA kann im Organismus persistieren, was bspw. zu einer Überaktivierung des Immunsystems führen
15 kann, welche bekanntermaßen in Mäusen in einer Splenomegalie resultiert (Montheith et al., 1997, s.o.). Die durch DNA-Adjuvanzen hervorgerufene Splenomegalie geht wesentlich auf eine Stimulation der B-Zell-Proliferation zurück, die bei erfindungsgemäßen RNA-Adjuvanzen nicht auftritt (Fig. 7 und 8). Des weiteren kann DNA mit dem Wirtsgenom wechselwirken, insbesondere durch Integration in das Wirtsgenom Mutationen hervorru-
20 fen. All diese hohen Risiken können bei Verwendung der chemisch modifizierten RNA zur Herstellung von immunstimulierenden Mitteln oder Vakzinen, insbesondere zur Impfung gegen oder zur Behandlung von Krebs- oder Infektionserkrankungen, bei besserer oder vergleichbarer Immunstimulation vermieden werden.

Patentansprüche

- 5 1. Immunstimulierendes Mittel, enthaltend mindestens eine RNA, die mindestens eine chemische Modifikation aufweist.
2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Nucleotid der RNA ein Analoges natürlich vorkommender Nucleotide ist.
- 10 3. Mittel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die RNA aus Nucleotidanaloga besteht.
- 15 4. Mittel nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Analoge aus der Gruppe, bestehend aus Phosphorthioaten, Phosphoramidaten, Peptidnucleotiden, Methylphosphonaten, 7-Deazaguanosin, 5-Methylcytosin und Inosin, ausgewählt ist.
- 20 5. Mittel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Analoge ein Phosphorthioat ist.
6. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die RNA aus 2 bis etwa 1000 Nucleotiden besteht.
- 25 7. Mittel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die RNA aus etwa 8 bis etwa 200 Nucleotiden besteht.
8. Mittel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die RNA aus etwa 15 bis etwa 31 Nucleotiden besteht.
- 30 9. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die RNA die Sequenz


5'-UCCAUGACGUUCCUGAUGCU-3',
5'-UCCAGGACUUCUCUCAGGUU-3' oder
5'-UCCAUGACGUUCCUGACGUU-3' aufweist.

- 5 10. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens ein Adjuvans enthält.
- 10 11. Mittel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Adjuvans aus der Gruppe, bestehend aus Cytokinen, Lipopeptiden und CpG-Oligonucleotiden.
12. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 11, weiter enthaltend einen pharmazeutisch verträglichen Träger und/oder ein pharmazeutisch verträgliches Vehikel.
- 15 13. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 12, zur Prävention und/oder Behandlung von Infektionserkrankungen oder Krebserkrankungen.
14. Vakzine, enthaltend das immunstimulierende Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 12 und mindestens ein Antigen.
- 20 15. Vakzine nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Antigen aus der Gruppe, bestehend aus Peptiden, Polypeptiden, Zellen, Zellextrakten, Polysacchariden, Polysaccharidkonjugaten, Lipiden, Glykolipiden und Kohlenhydraten, ausgewählt ist.
- 25 16. Vakzine nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Peptid- oder Polypeptidantigen in Form einer dafür codierenden Nucleinsäure vorliegt.
17. Vakzine nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Nucleinsäure eine mRNA ist.
- 30 18. Vakzine nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die mRNA stabilisiert und/oder translationsoptimiert ist.

19. Vakzine nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Antigen aus Tumorantigenen und Antigenen von Viren, Bakterien, Pilzen und Protozoen ausgewählt ist.
- 5
20. Vakzine nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass das virale, bakterielle, Pilz- oder protozoologische Antigen aus einem sekretierten Protein stammt.
21. Vakzine nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Antigen ein Polyepitop von Tumorantigenen oder Antigen von Viren, Bakterien, Pilzen oder Protozoen ist.
- 10
22. Vakzine nach einem der Ansprüche 14 bis 21 zur Impfung gegen Infektionserkrankungen oder Krebserkrankungen.
- 15
23. Verwendung einer RNA, wie in einem der Ansprüche 1 bis 10 definiert, zur Herstellung eines immunstimulierenden Mittels zur Prävention und/oder Behandlung von Infektionserkrankungen oder Krebserkrankungen.
- 20
24. Verwendung einer RNA, wie in einem der Ansprüche 1 bis 10 definiert, zur Herstellung einer Vakzine zur Impfung gegen Infektionserkrankungen oder Krebserkrankungen.


1/11

Fig. 1A




2/11

Fig. 1B




3/11

Fig. 2




4/11

Fig. 3




5/11

Fig. 4A



6/11

Fig. 4B



7/11

Fig. 5A






Fig. 5B




9/11

Fig. 6




10/11

Fig. 7



11/11

Fig. 8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 Internatⁿ Application No
 PCT/EP 03/07175

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61K31/7115 A61K31/7125 A61K39/00 A61K35/66 A61P37/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, CHEM ABS Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GRYAZNOV S M: "Oligonucleotide N3'→P5' phosphoramidates as potential therapeutic agents" BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. GENE STRUCTURE AND EXPRESSION, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 1489, no. 1, 10 December 1999 (1999-12-10), pages 131-140, XP004275528 ISSN: 0167-4781 page 135, right-hand column, paragraph 3 page 132, right-hand column, paragraph 3 -page 133, left-hand column, paragraph 1 abstract	1-7, 12, 13, 23, 24
Y	--- -/--	1-24

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 November 2003

Date of mailing of the international search report

02/12/2003

Name and mailing address of the ISA

 European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Greif, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 Internatic Application No
 PCT/EP 03/07175

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	AGRAWAL S: "Antisense oligonucleotides: towards clinical trials" TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, ELSEVIER PUBLICATIONS, CAMBRIDGE, GB, vol. 14, no. 10, 1 October 1996 (1996-10-01), pages 376-387, XP004035728 ISSN: 0167-7799	1-8,12, 13,23,24
Y	page 377, left-hand column, paragraph 4 -page 379, left-hand column, paragraph 1; table 1	1-24
X	EP 0 839 912 A (INSTITUUT VOOR DIERHOUDERIJ EN) 6 May 1998 (1998-05-06)	1,12-15, 19,22-24
Y	column 14, line 26 -column 17, line 34 column 4, line 5 -column 6, line 28 abstract	1-24
X	WO 01 93902 A (BIOSYNEXUS INC) 13 December 2001 (2001-12-13) claims 1-17 page 60, line 5,43 page 13, line 25 -page 23, line 12 page 9, line 4 -page 12, line 29 page 4, line 5-14 abstract	1-24
X	WO 02 00694 A (PARKS CHRISTOPHER L ;AMERICAN CYANAMID CO (US)) 3 January 2002 (2002-01-03)	1,10-13
Y	claims 17-19	1-24
X	US 6 322 967 B1 (PARKIN NEIL T) 27 November 2001 (2001-11-27)	1,12,13, 23,24
Y	column 8, line 22-65; claims 17,18	1-24
X	US 5 965 720 A (GRYAZNOV SERGEI M ET AL) 12 October 1999 (1999-10-12)	1-4,12, 13,23,24
Y	column 22, line 16-67; claims 1,2 abstract	1-24
A	HEIDENREICH O ET AL: "CHEMICALLY MODIFIED RNA: APPROACHES AND APPLICATIONS" FASEB JOURNAL, FED. OF AMERICAN SOC. FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY, BETHESDA, MD, US, vol. 7, no. 1, 1993, pages 90-96, XP002043382 ISSN: 0892-6638 the whole document	1-24
	--- -/--	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat
Application No
PCT/EP 03/07175

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	MATRAY T J GRYAZNOV S M: "Synthesis and properties of RNA analogs - oligoribonucleotides N3' - p5' phosphoramidites" NUCLEIC ACIDS RESEARCH, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, vol. 27, no. 20, 1999, pages 3976-3985, XP002955971 ISSN: 0305-1048 abstract	1-24
P, X	----- B. SCHEEL ET AL: "mRNA as immunostimulatory molecule" KREBSIMMUNTHERAPIE-ANNUAL MEETING 2003-ABSTRACT, 'Online! 9 May 2003 (2003-05-09), XP002261545 Retrieved from the Internet: <URL:http://www.kimt.de/archiv/abstracts/h tm> 'retrieved on 2003-11-07! SESSION 5, ABSTRACT 10 -----	1,12,13, 23,24

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internat Application No

PCT/EP 03/07175

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0839912	A	06-05-1998	EP 0839912 A1	06-05-1998
			AU 719991 B2	18-05-2000
			AU 5882898 A	22-05-1998
			BR 9712592 A	21-12-1999
			CZ 9901564 A3	15-09-1999
			EP 0935660 A1	18-08-1999
			HU 9903829 A2	28-03-2000
			JP 2000514314 T	31-10-2000
			KR 2000052920 A	25-08-2000
			WO 9818933 A1	07-05-1998
			PL 333070 A1	08-11-1999
			SK 54799 A3	16-05-2000
			US 6268199 B1	31-07-2001
			US 2002098573 A1	25-07-2002
			ZA 9709732 A	22-05-1998
WO 0193902	A	13-12-2001	AU 7529401 A	17-12-2001
			CA 2412026 A1	13-12-2001
			EP 1292331 A2	19-03-2003
			WO 0193902 A2	13-12-2001
WO 0200694	A	03-01-2002	AU 6701401 A	08-01-2002
			BR 0111827 A	20-05-2003
			CA 2409432 A1	03-01-2002
			CN 1437613 T	20-08-2003
			EP 1292615 A2	19-03-2003
			WO 0200694 A2	03-01-2002
US 6322967	B1	27-11-2001	US 6090391 A	18-07-2000
			US 2002119445 A1	29-08-2002
US 5965720	A	12-10-1999	US 5599922 A	04-02-1997
			AU 704549 B2	29-04-1999
			AU 2190095 A	09-10-1995
			CA 2184375 A1	28-09-1995
			CZ 9602745 A3	12-03-1997
			EP 0754242 A1	22-01-1997
			FI 963581 A	08-11-1996
			HU 76094 A2	30-06-1997
			JP 9510714 T	28-10-1997
			JP 2003012688 A	15-01-2003
			NO 963891 A	01-11-1996
			PL 316434 A1	06-01-1997
			WO 9525814 A1	28-09-1995
			US 5631135 A	20-05-1997
			US 5837835 A	17-11-1998
			US 5591607 A	07-01-1997
			US 6169170 B1	02-01-2001
			US 5726297 A	10-03-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internati

Aktenzeichen

PCT/EP 03/07175

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A61K31/7115 A61K31/7125 A61K39/00 A61K35/66 A61P37/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, CHEM ABS Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	GRYAZNOV S M: "Oligonucleotide N3'->P5' phosphoramidates as potential therapeutic agents" BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. GENE STRUCTURE AND EXPRESSION, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, Bd. 1489, Nr. 1, 10. Dezember 1999 (1999-12-10), Seiten 131-140, XP004275528 ISSN: 0167-4781 Seite 135, rechte Spalte, Absatz 3 Seite 132, rechte Spalte, Absatz 3 -Seite 133, linke Spalte, Absatz 1	1-7, 12, 13, 23, 24
Y	Zusammenfassung --- -/--	1-24

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. November 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

02/12/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Greif, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internati

Aktenzeichen

PCT/EP 03/07175

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	AGRAWAL S: "Antisense oligonucleotides: towards clinical trials" TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, ELSEVIER PUBLICATIONS, CAMBRIDGE, GB, Bd. 14, Nr. 10, 1. Oktober 1996 (1996-10-01), Seiten 376-387, XP004035728 ISSN: 0167-7799	1-8, 12, 13, 23, 24
Y	Seite 377, linke Spalte, Absatz 4 -Seite 379, linke Spalte, Absatz 1; Tabelle 1 ---	1-24
X	EP 0 839 912 A (INSTITUUT VOOR DIERHOUDERIJ EN) 6. Mai 1998 (1998-05-06)	1, 12-15, 19, 22-24
Y	Spalte 14, Zeile 26 -Spalte 17, Zeile 34 Spalte 4, Zeile 5 -Spalte 6, Zeile 28 Zusammenfassung ---	1-24
X	WO 01 93902 A (BIOSYNEXUS INC) 13. Dezember 2001 (2001-12-13) Ansprüche 1-17 Seite 60, Zeile 5, 43 Seite 13, Zeile 25 -Seite 23, Zeile 12 Seite 9, Zeile 4 -Seite 12, Zeile 29 Seite 4, Zeile 5-14 Zusammenfassung ---	1-24
X	WO 02 00694 A (PARKS CHRISTOPHER L ;AMERICAN CYANAMID CO (US)) 3. Januar 2002 (2002-01-03)	1, 10-13
Y	Ansprüche 17-19 ---	1-24
X	US 6 322 967 B1 (PARKIN NEIL T) 27. November 2001 (2001-11-27)	1, 12, 13, 23, 24
Y	Spalte 8, Zeile 22-65; Ansprüche 17, 18 ---	1-24
X	US 5 965 720 A (GRYAZNOV SERGEI M ET AL) 12. Oktober 1999 (1999-10-12)	1-4, 12, 13, 23, 24
Y	Spalte 22, Zeile 16-67; Ansprüche 1, 2 Zusammenfassung ---	1-24
A	HEIDENREICH O ET AL: "CHEMICALLY MODIFIED RNA: APPROACHES AND APPLICATIONS" FASEB JOURNAL, FED. OF AMERICAN SOC. FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY, BETHESDA, MD, US, Bd. 7, Nr. 1, 1993, Seiten 90-96, XP002043382 ISSN: 0892-6638 das ganze Dokument ---	1-24
	---	-/--

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internatio

Aktenzeichen

PCT/EP 03/07175

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>MATRAY T J GRYAZNOV S M: "Synthesis and properties of RNA analogs - oligoribonucleotides N3' - p5' phosphoramidites"</p> <p>NUCLEIC ACIDS RESEARCH, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, Bd. 27, Nr. 20, 1999, Seiten 3976-3985, XP002955971 ISSN: 0305-1048 Zusammenfassung</p>	1-24
P,X	<p>B. SCHEEL ET AL: "mRNA as immunostimulatory molecule"</p> <p>KREBSIMMUNTHERAPIE-ANNUAL MEETING 2003-ABSTRACT, 'Online! 9. Mai 2003 (2003-05-09), XP002261545 Gefunden im Internet: <URL:http://www.kimt.de/archiv/abstracts/h tm> 'gefunden am 2003-11-07! SESSION 5, ABSTACT 10</p>	1,12,13, 23,24

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Information

Aktenzeichen

PCT/EP 03/07175

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0839912 A	06-05-1998	EP 0839912 A1	06-05-1998
		AU 719991 B2	18-05-2000
		AU 5882898 A	22-05-1998
		BR 9712592 A	21-12-1999
		CZ 9901564 A3	15-09-1999
		EP 0935660 A1	18-08-1999
		HU 9903829 A2	28-03-2000
		JP 2000514314 T	31-10-2000
		KR 2000052920 A	25-08-2000
		WO 9818933 A1	07-05-1998
		PL 333070 A1	08-11-1999
		SK 54799 A3	16-05-2000
		US 6268199 B1	31-07-2001
		US 2002098573 A1	25-07-2002
		ZA 9709732 A	22-05-1998
WO 0193902 A	13-12-2001	AU 7529401 A	17-12-2001
		CA 2412026 A1	13-12-2001
		EP 1292331 A2	19-03-2003
		WO 0193902 A2	13-12-2001
WO 0200694 A	03-01-2002	AU 6701401 A	08-01-2002
		BR 0111827 A	20-05-2003
		CA 2409432 A1	03-01-2002
		CN 1437613 T	20-08-2003
		EP 1292615 A2	19-03-2003
		WO 0200694 A2	03-01-2002
US 6322967 B1	27-11-2001	US 6090391 A	18-07-2000
		US 2002119445 A1	29-08-2002
US 5965720 A	12-10-1999	US 5599922 A	04-02-1997
		AU 704549 B2	29-04-1999
		AU 2190095 A	09-10-1995
		CA 2184375 A1	28-09-1995
		CZ 9602745 A3	12-03-1997
		EP 0754242 A1	22-01-1997
		FI 963581 A	08-11-1996
		HU 76094 A2	30-06-1997
		JP 9510714 T	28-10-1997
		JP 2003012688 A	15-01-2003
		NO 963891 A	01-11-1996
		PL 316434 A1	06-01-1997
		WO 9525814 A1	28-09-1995
		US 5631135 A	20-05-1997
		US 5837835 A	17-11-1998
		US 5591607 A	07-01-1997
		US 6169170 B1	02-01-2001
		US 5726297 A	10-03-1998